

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO KLINIKOS

Vieni g. 2, LT-50009 Kaunas, tel. (8 37) 32 63 60, (8 37) 32 69 75, faks. (8 37) 32 64 27, el.p. rastine@kaunoklinikos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499, PVM kodas LT351634917

I. PACIENTO SUTIKIMAS CHIRURGINEI OPERACIJAI, INVAZINEI IR (AR) INTERVENCINEI PROCEDŪRAI

ANESTEZOLOGIJOS KLINIKA, I a. gyd. kab. tel. Nr. 8-37 32 61 84, II a. gyd. kab. tel. Nr. 8-37 32 63 40

17768
Gyd. Labina
JUOZAPAVICIENĖ

(profilinės klinikos, skyriaus pavadinimas, telefonas)

Opolyroja aukšt - stellimodex

(procedūrų vardas, pavardė, profesinė kvalifikacija)

(paciento, kuriam bus atliekama operacija, invazinė ir (ar) intervencinė procedūra, vardas ir pavardė, amžius)

ANESTEZIJA

SE DADIA

(chirurginės operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros pavadinimai)

Chirurginės operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros esmė (trumpas ir aiškus aprašymas), obūdis, tikslai.

Atlikiant numatyta chirurginę operaciją yra reikalinga (reikalingą pabraukti) anestezija:

a) bendroji; b) regioninė; c) kombinuota (bendroji kartu su regionine).

Anestezijai atliki ir sveikatos būklei stebėti bus švirkščiami vaistai ir atliekamos jvairios procedūros (reikalingas pabraukti):

- periferinių ir centrinių venų bei arterijų kateterizavimas;
- ~~kaukės ar vamzdelio įkišimas į kvėpavimo takus;~~
- subarachnoidinio ar epidurinio tarpo punkcija ir kateterizavimas;
- šlapimo pūslės kateterizavimas.
- dirbtinis kvėpavimas;
- periferinių nervų ir jų rezginių blokada;
- skrandžio zondavimas;

Atlikis Anesteziologijos klinikos gydytojas anestesiologas-reanimatologas ar jo prižiūrimas gydytojas rezidentas, adedant gydytojo anestesiologo-reanimatologo pasirinktiems asistentams ir naudojant jo pasirinktas priemones. Anestezijos tikslas – efektyviai numalsinti paciento skausmą numatomos operacijos metu ir pooperaciiniu laikotarpiu, stebėti ir esant reikalui koreguoti operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros metu kintančias organizmo funkcijas.

Operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros apimties keitimo leistinumo aptarimas, jei jos metu su pacientu to aptarti nebus galimiybės, o sutikimo metu to nuspėti negalima.

Sant neefektyviai regioninei anestezijai gali būti taikoma bendroji anestezija. Esant žymiems organizmo funkcijų ištimams operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros metu gali būti atliktos papildomos anestesiologinės procedūros, skirtos organizmo funkcijoms stebėti ir koreguoti.

Planuojamos atliki chirurginės operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros alternatyvių diagnostikos ir ydymo metodų esmė, jų tikslai, ypatumai, rizikos ir kitos paciento apsisprendimui svarbios aplinkybės (reikalingą pebraukti):

.) Jums numatytos operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros atveju saugios alternatyvos bendrajai anestezijai ėra.

.) Jums numatytos operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros atveju gali būti lygiavertiškai taikoma bendroji ir regioninė anestezija. Pasirinkus regioninę anesteziją atsigavimo laikotarpis po procedūros yra lengvesnis, jo metu esiasi efektyvus skausmo malšinimas.

Galimos ir svarbios paciento apsisprendimui dėl sutikimo davimo planuojamai chirurginei operacijai, invazinei ir (ar) intervencinei procedūrai komplikacijos:

- **žinomas ir dažnai pasitaikančios komplikacijos:**

gerklės perštėjimas, pykinimas ir vėmimas, galvos, nugaros ir raumenų skausmas (išnykstantis po kelių dienų), kraujosruvos ar audinių patinimas intraveninio kateterio vietoje, laikinas šlapimo susilaikymas, dantų, balso stygų pažeidimas;

- **retai pasitaikančios komplikacijos:**

vaistų šalutinės reakcijos, aukšta kūno temperatūra (piktybinė hipertemija), širdies ir kvėpavimo funkcijos sutrikimai, sapnai ar budrumas bendrosios anestezijos metu (prisimenama operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros ar jos dalies eiga), nervų sistemos sutrikimai (jutimų ir judėjimo sutrikimai, traukulai).

• **gulimos šiam konkretiam pacientui, ivertinus jo būklę:** *MVR, galvotas*

Kitos aplinkybės, svarbios paciento apsisprendimui

Sant būtinybei, gali būti perpiltas kraujas, jo sudedamosios dalys ar kraujo pakaitalai. Tokiu atveju egzistuoja rizika erpilant kraują užsikrėsti AIDS, hepatitu B, C, taip pat galimos hemotransfuzinės reakcijos.